



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du CHOUFLEUR


ITCMI 2010

	القرنبيط	
	CHOU FLEUR	
	CAULIFLOWER	
Nom botanique	<i>Brassica oleracea</i>	
Famille:	<i>Brassicacées</i>	
Espèce originaire de la méditerranée orientale		

I - PLANTE

- Quantité de semence au gramme : 300 à 400
- Germination : la levée s'effectue 8 à 10 jours
- Température optimale 15 à 18 °C
- Longévité moyenne de la graine : 5 à 6 à ans.
- Cycle végétatif : 55 à 65 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : levée.
10 : cotylédons étalés.
13 : 03 feuilles étalées.
49 : formation de la rosette ou tige principale.
51 : maturation des fruits.
61 : début de la floraison.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Super Boule de Neige, Boule de Neige, Géant de Naples, d'Erfurt, Astral...

IV - EXIGENCES

- Aime les sols limoneux, profonds, bien pourvus en matière organique
- L'induction florale est améliorée par des températures basses, constantes 8 à 12 °C
- pH: 6 à 6,8
- Salinité : plante moyennement tolérante 1,92 à 3,25 g / l (3 à 5 mmhos / cm⁻¹)

V - ZONES DE PRODUCTION

- Littoral : Alger, Boumerdes, Oran
- Sublittoral : Blida, Chlef
- Plaines intérieures : Sétif, M'sila

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

6.1- PREPARATION DU SOL

- Labour 15 à 25 cm (sols limoneux)
- Epandage fumure de fond, organique et minérale
- Disquage, hersage.



6.2 - SEMIS

En pépinière

100 g / Ha soit 150 à 180 m² de pépinière pour obtenir 10 000 à 15 000 plants / ha

Profondeur de semis : 1 à 1,5 cm

Epoque de semis :

- **Arrière saison** : juin - juillet
- **Primeur** : juillet - août
- **Saison** : août- septembre- octobre- novembre

Plantation:

Arrière saison : juillet - août

Primeur : Août –septembre

Saison : Décembre- janvier

Distances de plantation :

Entre rangs : 0,80 à 0,90 m

Entre plants : 0,60 à 0,70 m

Densité : 15 000 à 21 000 plants / ha



6.3- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, buttage, désherbage

6.4 - FERTILISATION

- ✚ **Fumure organique** : 40 t / ha de fumier.
- ✚ **Fumure minérale de fond** : 100 à 150 unités de N / ha
60 à 80 unités de P / ha
150 à 200 unités de K / ha
- ✚ **Fumure de couverture** : 2 apports de 20 unités de N.
1^{er} apport un mois après plantation.
2^{ème} apport 20 jours après le 1^{er} apport.



6.5 - IRRIGATION

A la raie, plante moyennement exigeante en eau **2800 à 3000 m³ / ha** (doses et fréquences selon le stade végétatif).


VII - PROTECTION SANITAIRE

INSECTICIDE



↑
Pucerons

Mouche du chou →
Phytosol
Birlane



Chenille ou Puceron
Orthène 50 I
Deltaméthrine.

Chenilles →



HERBICIDE

Pré- semis: Trifluraline (tréflan)
Post levée : Pyridate (Stade 2 à 3 feuilles)

VIII - RECOLTE

Manuelle, à l'aide d'un couteau

Rendements 15 à 25 t / ha



FTV : LA CULTURE DU CHOU-FLEUR (1HA)
RDT : 150 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Achat plants	-	-	-	-	-	-	12000	2	24000	24000
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	24000
II. Travaux du sol :										
-Apport fumure minérale (NPK)	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
							10 qx	6000	60000	60000
- Labour	1	600	300	8	500	4000		-		4300
-Disquage + hersage	0,5	600	150	4	500	2000		-		2150
- Rayonnage	0,5	600	300	4	500	2000		-		2300
S/T	2,5	-	1050	20	-	10000	-	-	60000	71050
III .Plantation + Entretien :										
- Pré- irrigation	1	600	600	-	-		-	-		600
- Plantation	7	600	4200	-	-		-	-		4200
- Désherbage	1	600	600	8	500	4000	1,2 kg	150	180	4780
- Binage + buttage	10	600	6000	-	-		-	-		6000
- Irrigations	4	600	2400	-	-		2000 m3	4	8000	10400
- Apport engrais (Ammonitrate.33,5%)	0,5	600	300	4	500	2000	1 ql d°N	6000	6000	8300
- Traitement + produits	4	600	2400	8	500	4000		-	15000	21400
S/T	27,5	-	16500	20	-	10000	-	-	29180	55680
IV. Récolte + transport :										
- Récolte	15	600	9000	-	-		-	-		9000
- Transport	4	600	2400	16	500	8000	-	-		10400
S/T	19	-	11400	16	-	8000	-	-		19400
Total Général	49	-	28950	56	-	28000	-	-	113180	170130